



CUPROVIN 50

Anorgansko mineralno gnojilo z mikroelementom baker (Cu), iz bakrovega oksiklorida, namenjeno foliarnemu gnojenju kmetijskih rastlin.

Tip gnojila: FKS 1(C)(II)(a)

CAS No.: 1332-65-6

EC No.: 215-572-9

UFI: 3C00-N088-300X-GT83

Uporaba

Cuprovin 50 uporabljamo za foliarno gnojenje kultur med vegetacijo. Število gnojenj je odvisno od potreb posameznih kultur, pogojev njihove pridelave in simptomom pomanjkanja bakra. Pripravek dobro vpliva na pridelek, izboljšani so encimatski procesi, fotosinteza in sprejem hranil, umirja rast rastlin in tako poveča odpornost rastlin. Letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne sme presegati 4 kg čistega bakra na ha.

Gnojilo ne mešamo s kislimi ali z močno bazičnimi sredstvi.

Priporočeni odmerki

Kultura	Odmerek	Fenološka faza	Poraba vode
Vinska trta	do 2,0 kg/ha	od drugi list razprt do pojava socvetij in od konec cvetenja do začetek zorenja jagod	do 600 l/ha
Pečkato sadje (jablane, hruške)	do 2,0 kg/ha	od začetek odpiranja brstov do začetka cvetenja, in jeseni po obiranju plodov	do 600 l/ha
Koščičasto sadje (breskve, marelice, nektarine, češnje)	do 2,0 kg/ha	od začetek nabrekanja listnega brsta do začetka cvetenja in jeseni po obiranju plodov	do 600 l/ha
Jagode	do 1,0 kg/ha	pred cvetenjem in po spravilu	do 600 l/ha
Čebula	do 1,0 kg/ha	začetna faza razvoja	do 600 l/ha
Krompir, paradižnik, kumare	do 2,0 kg/ha	celotna vegetacija	do 600 l/ha
Oljka	do 1,0 kg/ha	od 2 do 3 aplikacije v času vegetacije	do 600 l/ha
Lupinarji (orehi, lešniki)	do 2,0 kg/ha	pred in po cvetenju	do 800 l/ha

Gnojilo ne sme nekontrolirano prehajati v okolje in mora biti všteto v bilanci letnega vnosa bakra na istem zemljišču.